

· 病例报告 ·

治疗乙状结肠直肠烧伤一例

秦巍 林海涛 罗军复 石团元 杨艳清 龚黎明 陶文俊

患者女, 38 岁, 因子宫肌瘤拟行手术治疗。术前常规清洁灌肠时误将 80 ℃ 软皂液(未兑冷水) 500 ml 灌入结肠内, 患者当即感疼痛不适, 但未引起医护人员重视, 留置 10 min 后排便。当晚患者感下腹部剧痛, 肛周皮肤可见水疱。此后连续数日自肛门排出大量淡红色血性液体, 伤后 1 周行电子结肠镜检查见: 乙状结肠距肛缘 17 cm 以下(含直肠) 黏膜充血、水肿、糜烂, 血管纹理模糊, 溃疡, 基底污秽(图 1)。患者体温 36.8 ℃, 心率 76 次/min, 呼吸 20 次/min。实验室检查: 外周血白细胞 $12.7 \times 10^9/L$, 大便常规检查见高倍镜下脓细胞满视野。嘱患者进流质饮食, 庆大霉素溶液(1 g/L) 及复春散 1 号[通化昌源灼伤研究所, 专卫消证字(2002)第 023 号]

溶液各 50 ml 保留灌肠, 1 次/d。3 d 后单独使用复春散 1 号 50 ml 保留灌肠, 1 次/d。16 d 后患者自觉症状逐渐减轻, 大便趋于正常。复行电子结肠镜检提示乙状结肠黏膜上皮化, 直肠仅见散在溃疡(图 2)。3 周后患者治愈出院。

讨论 直肠结肠烧伤临床罕见, 应引以为戒。电子结肠镜检查, 对判断病情很有帮助, 同时可以指导临床医生制定治疗计划。文中使用的日本奥林巴斯公司所产 240 型电子结肠镜, 直径仅 9 mm, 检查损伤较小, 但仍要注意操作时尽量轻柔, 避免损伤肠壁。应用纯中药制剂复春散 1 号溶液保留灌肠, 效果较好。它主要成分是黄柏、黄芩、黄连、没药、熟粉、冰片等, 具有脱腐、镇痛、收敛、生肌之功效。




图 1 治疗前电子结肠镜检查提示患者肠黏膜充血水肿, 溃疡糜烂



图 2 治疗后患者肠黏膜, 炎症减轻逐渐上皮化

作者单位: 434001 荆州市第三人民医院烧伤整形科

(收稿日期: 2003-08-25)

(本文编辑: 王旭)

孕妇特大面积烧伤一例

郑轲

患者女, 24 岁。高压蒸气烫伤后 50 min 入院。查体: 患者意识清楚, 语言清晰, 体温 37 ℃, 心率 174 次/min, 呼吸 28 次/min, 血压 142/82 mm Hg(1 mm Hg = 0.133 kPa)。痛苦面容, 孕妇体型, 无咳嗽及声音嘶哑, 查体欠合作。子宫底位

于脐上四指, 未查出胎体及胎心, 阴道无溢血。全身表皮大部分撕脱, 头部未烧伤, 创面基底苍白或红白相间, 渗出液较多, 污染程度轻。诊断: (1) 蒸气烫伤总面积 97%, 其中浅 II 度 8%、深 II 度 36%、III 度 53% TBSA。(2) 低血容量性休克。(3) 28 周孕, 孕 2 产 0。患者入院后采取补液抗休克、心电监护、持续吸氧、预防并发症等措施。静脉滴注头孢三嗪 2.0 g

作者单位: 644500 宜宾市第二人民医院整形烧伤科